

راهنمای آزمایش مدفوع جهت بررسی انگل
آمادگی قبل از انجام آزمایش: لازم است جمع آوری نمونه مدفوع قبل از مصرف آنتی بیوتیک ، ترکیبات ضد اسهال ، باریوم ، بیسموت و یا روغن معدنی صورت گیرد. نمونه گیری باید تا زمانیکه اثر این مواد از بین می رود به تعویق افتد که حدود یک هفته پس از مصرف باریوم و 2-3 هفته پس از مصرف سایر داروها می باشد.

نحوه جمع آوری نمونه: نمونه مدفوع مستقیماً به داخل ظرف جمع آوری تمیز و خشک ، ریخته شود. باید توجه کرد که مدفوع با آدرار یا آب توالت آلوده نشود. در صورتیکه مدفوع نمای خونی ، آبکی یا بلغمی دارد حتماً از این نواحی نمونه گیری شود. می توان از قاشق پلاستیکی یا آبسلانگ برای انتقال نمونه به ظرف استفاده کرد. ظرف را پر نکنید و درب ظرف را محکم ببندید.

شرایط نگه داری نمونه و نحوه انتقال : نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل شود. در غیر این صورت تا زمان رسیدن به آزمایشگاه در دمای یخچال (2-8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود و از قرار دادن نمونه ها در محیط گرم یا در مجاورت نور خورشید خودداری شود. تاخیر در انجام آزمایش می تواند بر نتایج آن تاثیر منفی داشته باشد. چون هر نمونه مدفوع می تواند منبع مهمی جهت انتقال باکتری ، ویروس و انگل محسوب شود، لذا باید به رعایت نکات بهداشتی در هنگام جمع آوری و انتقال آن توجه شود.