

## شرایط انجام تست پرولاکتین

زمان مناسب جهت نمونه گیری برای انجام آزمایش، صبح هنگام و حداقل 2 ساعت بعد از بیدار شدن، از خواب م، باشد.  
توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی، ورزش و هر نوع فعالیت بدنی احتنا باشد.  
شب قبا، از آزمایش،، از به شدن، لباس، تنگ بخصه ص، در ناحیه سینه احتنا باشد.  
حداقل طی 12 ساعت قبل از آزمایش تماس جنسی و تحریک سینه انجام نشده باشد.  
استرس، جراحی اخیر یا حتی ترس از آزمایش خون می تواند سطح پرولاکتین را بالا سد. در صورت عدم مهارت دک شده آزمایشگاه، مطلع نماید.  
داروهایی مانند داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای ضدافسردگی، فنوتیازینها، رزپین، وراپامیل، آنتی هیستامین ها، رزپین، وراپامیل، متیل دوپا، مخدرها، داروهای ضدبارداری خوراکی و استروژن باعث افزایش و داروهای مانند دوپامین، لوودوپا، کلونیدین و مشتقات آکالوئیدهای ارگوت باعث کاهش پرولاکتین می شوند. در صورت مصرف این داروها آزمایشگاه را مطلع نمایید.