



امپرازول

کپسول امپرازول داروی مورد استفاده برای بیماری‌های مربوط به معده و دستگاه گوارش است.

کپسول امپرازول برای جلوگیری از زخم معده، ریفلاکس و سوزش معده تجویز می‌شود.

موارد مصرف این دارو

جلوگیری یا درمان زخم‌های دستگاه گوارش (معدده و روده) ناشی از عفونت، درمان بیماری ریفلاکس معده، درمان سوزش سردل، درمان سندرم ناشی از زیادی اسید معده، جلوگیری یا درمان زخم‌های مری.

مقدار و نحوه مصرف قرص امپرازول

کپسول را کاملاً ببلعید و از جویدن، شکستن یا خرد کردن آن‌ها خودداری نمایید.
صبح‌ها و قبل از صبحانه با یک لیوان آب و با فاصله از داروهای دیگر مصرف شود.
میزان مصرف این دارو برای هر فرد متفاوت بوده و حتماً باید توسط پزشک تعیین گردد. به طور معمول برای درمان زخم معده در بزرگسالان مقدار ۲۰ میلی گرم (یک کپسول) از راه خوراکی، یک بار در روز به مدت ۴ الی ۸ هفته ادامه یابد.

عوارض جانبی قرص امپرازول

- سردرد و سرگیجه
- ناراحتی معده یا بالا آوردن (استفاده از وعده‌های غذایی کم با دفعات بیشتر، مکیدن آب نبات‌های سخت یا جویدن آدامس بدون قند این مشکل را کم می‌کند).
- اسهال، درد شکم، استفراغ، تهوع، یبوست، خشکی دهان
- تکرر ادرار، افزایش کراتینین، ادرار خونی، خارش و خشکی پوست، سرفه و خونریزی از بینی

***در صورت ادامه یا بروز مزاحمت هریک از عوارض ذکر شده با پزشک مشورت نمایید.**

در صورت فراموش کردن یک دوز دارو چه باید بکنم؟

اگر دوزی از دارو را فراموش کردید، به محض اینکه به یاد آوردید آن را مصرف کنید. اگر نزدیک به زمان دوز بعدی است، دوز قبلی را مصرف نکنید و برنامه دوز معمول خود را ادامه دهید. مقدار دوز دارو را برای دریافت تاثیر بیشتر دو برابر نکنید.

علائم هشدار دهنده

• در صورتی که دچار تب، گلو درد، خستگی، زخم های باریک در دهان، لب ها و عوارض پوستی شدید، سوزش سر دل به همراه سبکی سر / تعریق / سرگیجه و احساس سنگینی، درد قفسه سینه، فک، بازو یا شانه (بخصوص همراه تنگی نفس، تعریق غیر عادی)، شده اید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

افرادى که نباید امپرازول مصرف کنند:

- مشکلات کبدی**
- کمبود ویتامین B۱۲**
- پوکی استخوان**
- کاهش منیزیم در سطح خون**
- زنان باردار و شیرده**
- سالمندان و کودکان**
- افرادی که وارفارین مصرف میکنند (باعث افزایش خونریزی می شود).**

آموزش های خود مراقبتی

- قبل از مصرف امپرازول اگر به این دارو یا داروهای مشابه از جمله اسموپرازول، لانسوپرازول و پنتوپرازول حساسیت دارید حتما به پزشک اطلاع دهید.
- قبل از مصرف قرص و کپسول امپرازول حتما سابقه پزشکی خود را در اختیار پزشک یا داروخانه قرار دهید بخصوص اگر از بیماری های کبدی یا لوپوس رنج می برید یا دچار کمبود منیزیم هستید.
- آموزش سلامت: از مصرف دخانیات، مشروبات الکلی اجتناب نمایید.
- از استرس و اضطراب دوری نمایید.
- از داشتن اضافه وزن پرهیز نمایید.

