



مدفوع به صورت سیاه و قیری - اشکال در بلع غذا-خارج کردن جسم خارجی- برای بررسی ضایعات قبلی و پیگیری آنها از نظر روند بهبودی-تشخیص عفونت های هلیکوباکتری و تشخیص سرطان های دستگاه گوارش می باشد.

### آموزش بدو پذیرش

آندوسکوپی با دستور کتبی پزشک - رضایت بیمار و اخذ نوبت قبلی قابل انجام است. لازم است بیمار به مدت ۸ ساعت کاملاً ناشتا باشد لذا توصیه می شود در صورت انجام آندوسکوپی صبح بیمار شب قبل شام سبکی میل نموده و از ساعت ۱۲ شب به بعد از خوردن و آشامیدن اجتناب نماید. جویدن آدامس ممنوع می باشد. بهتر است از ۳ ساعت قبل از کشیدن سیگار اجتناب نماید. بیمار باید مصرف هر گونه دارو را به پزشک اطلاع دهد. اگر بیماری خاصی مثل بیماری قلبی و ریوی - هپاتیت - ایدز و بیماریهای خونریزی دهنده دارید حتماً پزشک خود را مطلع نماید چون

ممکن است ملاحظات خاصی لازم باشد.

لازم است بیمار یک نفر همراه داشته باشد چون ممکن است خواب آور ضعیفی برای بیمار تجویز شود و بیمار بعد از آندوسکوپی خواب آلود باشد و قادر به رانندگی نباشد.

### آموزش حین آندوسکوپی

برای این اقدام پزشکی دندانهای مصنوعی باید در آورده شود. درست قبل از این کار گلوئی بیمار با مواد بی حس کننده برای جلوگیری از عق زدن بی حس خواهد شد. لازم است بیمار در حین آندوسکوپی به پهلوی چپ خوابیده و از قورت دادن آب دهان در حین آندوسکوپی اجتناب نماید لازم به ذکر است در طول آندوسکوپی راه هوایی باز می باشد و شما می توانید به راحتی نفس بکشید. طول مدت آندوسکوپی حداکثر ۲ دقیقه خواهد بود.

### آندوسکوپی چیست؟

آندوسکوپ یک لوله ی بلند باریک و انعطاف پذیر که در انتهای آن دوربین تعبیه شده است که برای دیدن دستگاه گوارش بکار میرود. دستگاه از راه دهان به مری معده و دوازدهه (اولین قسمت روده ی باریک) فرستاده می شود.

### موارد انجام آندوسکوپی فوقانی


مهمترین موارد مورد استفاده شامل: تهوع- استفراغ مقاوم - درد ناحیه ی فوقانی شکم- سوزش سردل- احساس سوزش در گلو یا قفسه ی سینه- وجود استفراغ های خونی یا وجود خون در

احساس خش خش در زیر پوست گردن  
یا قفسه ی سینه



مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

## آندوسکوپی فوقانی



تهیه و تنظیم: م. علی مهرکارشناس پرستاری  
زیر نظر واحد آموزش بیمارستان امام رضا تبریز

تاریخ تهیه: ۱۳۹۵  
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۲

## آموزش حین ترخیص

بعد از برطرف شدن بی حسی گلو می  
توانید غذا بخورید. ممکن است پزشک  
موقع آندوسکوپی نمونه هایی را هم  
برای بررسی و تجزیه تحلیل در  
آزمایشگاه اخذ کند در این صورت با در  
دست داشتن جواب آندوسکوپی و نمونه  
ی ارسالی به آزمایشگاه به پزشک خود  
جهت ادامه ی درمان مراجعه کنید.

## عوارض آندوسکوپی

عوارض و خطرات آندوسکوپی ناچیز  
است و تکرار آن حتی در فواصل کوتاه  
در صورت لزوم مانعی ندارد اما علائمی  
که باید سریعاً گزارش داده شوند عبارتند  
از: درد شدید شکمی (به غیر از دردهای  
کرامپی)-سفت و متسع شدن شکم- تب  
استفراغ- اشکال در بلع و درد شدید گلو-

منبع: کتاب پرستاری بیماریهای گوارش برونر

آدرس سایت

[www.TBZMED.ac.ir](http://www.TBZMED.ac.ir)

تلفن تماس: ۰۴۱۳۳۳۴۷۵۵۴