

ERCP چیست؟

ای آر سی پی یا کلانژیو گرافی آندوسکوپیک به معنی تصویر برداری از مجاری صفراوی و پانکراس توسط آندوسکوپ است.

در ای آر سی پی پزشک به کمک آندوسکوپ و پس از وارد شدن به لوله ی گوارش و رسیدن به محدوده ی ورود صفرا به روده در دوازدهه ماده ی حاجب را به داخل مجاری صفراوی تزریق می کند.

موارد استفاده

ای آر سی پی در تشخیص سنگ مجاری صفراوی- تومورهای پانکراس و مجاری صفراوی و کیست ها و انگلها بکار میرود.

آمادگی قبل

• ناشتا بودن از ۸ ساعت قبل از شروع

• به همراه داشتن تمامی مدارک قبلی

• در صورت داشتن سن بالای ۵۰- بیماری قلبی و ریوی و دیابت داشتن مشاوره ی بیهوشی و قلبی ضروری میباشد.

• داشتن آزمایشات انعقادی (PT- PTT-INR-CBC-PLT) ضروری می باشد.

• در صورت داشتن هرگونه بیماری و مصرف داروی ضد انعقاد و احتمال حاملگی- سابقه حساسیت - سکتة قلبی اخیر پزشک و پرسنل بخش آندوسکوپي را مطلع نمایید.

آموزش های حین ای آر سی پی

• دندانهای مصنوعی در آورده شود.

• تعبیه ی آنژیوکت از دست چپ

• خوابیدن به روی شکم

آموزش زمان ترخیص

بعد از هوشیاری کامل بیمار به بخش منتقل می شود و تا ۲۴ ساعت بعد تحت نظر خواهد بود. تا ویزیت بعدی و اجازه ی پزشک از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید.

علائم زیر باید فوراً گزارش شوند:

- درد شدید شکمی

- شکم متسع سفت

- استفراغ شدید

- تب و لرز

- اشکال در بلع

در نهایت بیمار ان باید ۲۴ ساعت بعد از ERCP در بیمارستان تحت



مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

ERCP



تهیه و تنظیم: م. علی مهر کارشناس پرستاری

زیر نظر واحد آموزش بیمارستان امام رضا تبریز

تاریخ تهیه: ۱۳۹۶
تاریخ بازنگری: تابستان ۱۴۰۰



WWW.TBZMED.EMAMREZA.AC.IR

منبع: کتاب برونر سودارث

شماره تماس: ۰۴۱۳۳۳۴۷۵۵۴

نظر بوده تا از نظر بروز
عوارض احتمالی بررسی
گردند.

۲۴ ساعت بعد از انجام ERCP
در صورت عدم بروز عوارض
بیمار قابل ترخیص است.

عوارض مربوط به
اقدامات ERCP:

- خونریزی
- پانکراتیت
- سوراخ شدگی
- میزان بروز عوارض ۷٪ می
باشد.
- ۰,۱٪ درصد احتمال مرگ و
میر