

آمبولی ریه :

آمبولی ریه وقتی اتفاق می افتد که لخته خون از محل اولیه جدا شود و در عروق ریه گیر بیفتد منشا اغلب لخته ها یکی از ورید های پا و لگن می باشد که خود این اختلال را ترمبوز ورید عمقی می نامند انسداد عروق ریه باعث کاهش اکسیژن و خون رسانی به مغز و یا سایر اندام ها می شود.

علل بروز:

برخی شرایط که بیمار را مستعد آمبولی ریه می کنند شامل سابقه ی داشتن ترومبوز آمبولی سابقه ی نارسایی قلبی سابقه بیماری های کلیوی مصرف دارو های پیشگیری از بارداری همگی از عوامل مستعد کننده ابتلا به آمبولی ریه می باشند برخی اقدامات جراحی و بی تحرکی بعد از آن بروز لخته را زیاد می کنند

برخی شرایط مانند جراحی های بزرگ به ویژه جراحی های ارتوپدی روی لگن زانو آسیبهای بدنبال تصادف به ویژه در صورت درگیری عروق نشستن های طولانی مدت به ویژه بیش از شش ساعت روی صندلی یا تخت از عوامل مستعد کننده می باشد برخی اختلالات خونی مثل پلی سیستمی برخی بیماریهای اتوایمن از علل خطر این بیماری می باشند.

علائم آمبولی:

علائم در بیماران مختلف متفاوت می باشد ولی شایع ترین آن تنگی نفس تپش قلب سرفه و خلط خونی و درد موضعی می باشد

تشخیص آمبولی ریه :


سی تی اسکن آنژیوگرافی ریه می باشد.

درمان ترومبوز آمبولی وریدی:

درمان ترومبوز ورید های عمقی و آمبولی ریه مشابه است . هدف اصلی درمان در ترومبوز ورید عمقی پیشگیری از آمبولی ریه می باشد . سایر اهداف درمانی شامل پیشگیری از عوارض دراز مدت ترومبوآمبولی وریدی است . درمان اولیه ی ترومبوآمبولی وریدی دارو های ضد انعقاد می باشد و یا تعبیه فیلتر در ورید های بزرگ می باشد .

آمبولی ریه

(وجود لخته خون در عروق ریه)



گروه هدف: بیماران ریوی

تهیه و تنظیم: شبیم انوری کارشناس پرستاری

زیر نظر: دکتر غفاری (رییس بخش)

تاریخ تهیه: ۱۳۹۶

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۱

با آرزوی سلامتی برای شما بیماران و همراهان
محترم

منابع: مجموع کتاب های برونر سوارث
انتشارات بشری

شماره تماس واحد مربوطه ۰۴۱۳۳۳۴۷۰۵۴

آدرس سایت:

www.imamreza.tbzmed.ac.ir

توصیه های خود مراقبتی:

بیماران با سابقه ترومبوآمبولی وریدی در
معرض خطر بیشتری برای حملات بعدی
هستند. اگرچه این خطر به صورت قابل
توجهی طی درمان ضد انعقاد کاهش میابد اما
باید این بیماران به علایم و نشانه های عود
بیماری شامل درد تورم ساق پا تنگی نفس و
تپش قلب و درد قفسه سینه توجه داشته
باشند. در صورت فراموشی یه دوز دارو بهتر
است جهت تنظیم دوز با پزشک خود مشورت
کنید. بیمار طی درمان ضد انعقاد به راحتی
دچار خون ریزی می شود خون ممکن است
در هر جای بدن اتفاق بیافتد