

تعریف بیماری:

شایعترین ساختمان گوش که بوسیله ضربه آسیب می بیند پرده گوش است. علاوه بر آن عفونت باکتریایی و ویروسی، آسیب، انفجار یا سیلی شدید به گوش، ورود اجسام خارجی و پرت شدن در آب می تواند باعث پارگی پرده گوش شود. در صورتی که پارگی خود بخود خوب نشود از روش ترمیم پرده صماخ یا تمپانو پلاستی استفاده می شود.

علل و منشا:

شایعترین علت آسیب به پرده گوش ضربه می باشد. عفونت، انفجار، سیلی شدید، ورود اجسام خارجی، پرت شدن در آب از سایر علل این بیماری است، همچنین در صورتی که ضمن وجود عفونت فشار گوش میانی از فشار موجود در جراحی گوش خارج بیشتر باشد پرده صماخ پاره می شود.

علائم و نشانه ها:

- ۱- درد شدید گوش که ممکن است به طور ناگهانی از بین برود.
- ۲- کم شنوایی در گوش آسیب دیده که بستگی به اندازه سوراخ گوش دارد.
- ۳- خروج ترشحاتی از گوش که ممکن است حاوی خون باشد.
- ۴- احساس گرفتگی گوش.
- ۵- گیجی و احساس عدم تعادل.
- ۶- تب.


تشخیص:

در این بیماریاز روش هایی همچون تمپانومتري وتست شنواییسنجش استفاده می شود که در روش تمپانومتري پزشک با نتایج بدست آمده تشخیص می دهد آیا درگوش عفونت وجمع شدگی مایع وجود دارد یاخیر .وهمچنین پارگی پرده گوش بررسی می شود.

درمان بیماری:

اکثر پارگی های پرده صماخ چند هفته پس از پارگی بطور خود بخودی بهبود می یابد در صورتی که پارگی پرده صماخ خودبه خود التیام نیافت نیاز به جراحی می شود تصمیم برای انجام ترمیم پرده صماخ معمولا براساسنیاز به پیشگیری از عفونت و بهبود شنوایی بیمار میباشد .جراحی با استفاده از یک میکروسکوپ اتاق عمل انجام می گرددو طی آن سوراخ پرده ترمیم می شود.

جراحی ترمیم پرده گوش



گروه هدف: بیماران بخش گوش حلق بینی

تهیه و تنظیم: مهسا شاهی کارشناس پرستاری

زیر نظر: رییس بخش دکتر لطفی

تاریخ تهیه: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

تاریخ بازنگری: فروردین ۱۴۰۱

۱۲- ده روز پس از عمل می توانید با قرار دادن پنبه آغشته به وازلین درگوش سر راشستشو دهید.

۱۳- دست کم به مدت یک هفته از انجام فعالیت های سنگین و ورزش بپرهیزید.

۱۴- اصلا روی گوش عمل شده نخوابید.

۱۵- تا زمان اجازه ی پزشک مجاز به رفتن به استخر و شنا نخواهید بود

۱۶- خودداری از رانندگی تا ۳ الی ۴ روز بعد عمل.

منابع: درسنامه برونر سوارث ۲۰۱۸

ویراست چهاردهم

مترجم: مرضیه شبان و معصومه لطیفی

سایت مرکز:

www.imamreza.tbzmed.ac.ir

شماره تماس: ۰۴۱،۳۳۳۴۷۰۵۴

داخلی: ۳۰۵۱-۳۰۵۲

آموزش مراقبتی:

۱- لازم است در زمان استراحت سرکمی بالاتر از بدن قرار گیرد.

۲- چندساعت پس از جراحی وبا صلاحدید پزشک از مایعات استفاده کنید در صورت عدم تهوع استفاده از رژیم نرم مانعی ندارد .

۳- عطسه و سرفه با دهان باز باشد.

۴- از باد انداختن درگوش و فین کردن بپرهیزید.

۵- سرزمان تعیین شده به پزشک جهت معاینه مجدد جهت بررسی وضعیت گوش مراجعه کنید.

۶- پانسمان گوش به هیچ عنوان باز و خیس نشود.

۷- ترشحات خونیو آبکی بدون بو ممکن است از گوش خارج شود نگران نباشید، در صورتی که این ترشحات زرد رنگ و بد بو باشد لازم است به پزشک مراجعه کنید.

۸- احساس درد و تیرکشیدن در گوش که با مصرف مسکن طبق تجویز پزشک رفع می شود.

۹- مراقب باشید سرما نخورید.

۱۰- از سفرهای هوایی تا مدتی بپرهیزید.

۱۱- تا دوهفته از ورود آب به گوش خودداری کنید.