



خونریزی ساب دورال

خون مردگی بین دورال یا سخت شامه و مغز در اثر ضربه یا تروما خونریزی ساب دورال نامیده می شود

علل و منشاء بیماری:

از علل این بیماری میتوان به انواع تروما به سر و تصادفات ، ضرب و شتم و سقوط نا برد. در نوع دیگر این بیماری که شامل خو.نریزی بدون ضربه است میتوان به افزایش فشار قلبی اشاره کرد .

علائم و نشانه های بیماری:

از علائم بیماری می توان به مشکلات بینایی از قبیل دوبینی ، تاری دید ، ضعف بینایی اشاره کرد
علائم دیگر مانند افت هوشیاری فرد در حد گیجی تا کما قابل انتظار است
علائم گوارشی نظیر تهوع ، استفراغ در این بیماری دیده می شود .

تشخیص بیماری:

جهت مشاهده خونریزی و هماتوم (لخته خون) از سی تی اسکن استفاده می شود. جهت تشخیص دقیق تر و زمان دقیق خونریزی می توان از ام آر آی نیز استفاده نمود

مراحل و طول مدت درمان:

درمان بر حسب محل و اندازه و فشار روی*
مغز از درمان حمایتی تا جراحی متفاوت است

*اگر هماتوم کوچک باشد با درمان حمایتی درمان میشود و با سی تی اسکن های مکرر کنترل می شود.

***اگر بزرگ باشد و فشار روی مغز ایجاد کند نیاز به جراحی خواهد داشت**

***پس بر اساس تشخیص پزشک دو نوع درمان در این نوع خونریزی در دسترس پزشک می باشد**

***باز توانی با استراحت و مصرف داروها انجام خواهد شد**

آموزش خود مراقبتی:

پوزیشن مناسب در بیماران با تشخیص فوق پوزیشن خوابیده با بالا بودن ۳۰ درجه سر می باشد تا ضمن کمک به تامین اکسیژن رسانی به کاهش فشار مغزی جلوگیری از افزایش فشار داخل مغزی کمک کند.
حفظ تعادل مایعات : جایگزین کردن مایعات بیمار با مصرف مایعات در منزل

حفظ آرامش بیماران : استفاده از اتاق های آرام و تاریک و با بیماران کم در این بیماران به حفظ آرامش در بیماران کمک میکند

بیماران توجه داشته باشند در صورت بروز هر گونه ترشح از زخم و تورم و کاهش هوشیاری یا تشنج باید به پزشک مراجعه کند.

حمایت تنفسی : دریافت اکسیژن در این بیماران بصورت حمایتی بعلت کمک به تنفس و اکسیژن رسانی و به بدن و جلوگیری از افت سطح اکسیژن بیماران انجام می گردد.