

پس زدن کلیه پیوندی:

پس زدن کلیه پیوندی هنگامی رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن کلیه فرد غریبه را به عنوان بافت غیر خودی شناسایی کرده و برای از بین بردن و دفع آن وارد عمل میشود سیستم ایمنی نقش مهمی را در حفاظت از بدن در برابر عفونت ایفا میکند. سیستم ایمنی بدن به نحوی طراحی شده است که به جستجوی بافت های خارجی از قبیل عضو پیوند شده می پردازد و به آن حمله می کند . اگر به بیمار گیرنده کلیه پیوندی دارو های سرکوب کننده سیستم ایمنی داده نشود حتما کلیه اهدایی شناسایی کرده و آنرا از کار می اندازد فرآیند تخریب و حمله به عضو جدید پس زدن کلیه پیوندی نام دارد. بنابراین به تمام بیماران پیوندی مجموعه ای از داروهای سرکوب کننده ایمنی داده می شود تا کلیه اهدایی رو پس نزنند .

انواع پس زدن کلیه پیوندی:

- **پس زدن فوق حاد:** این نوع پس زدن در مراحل اولیه پس از پیوند کلیه رخ میدهد که در این شرایط آنتی بادی های بدن بیمار کلیه پیوند شده را به عنوان یک جسم خارجی شناسایی کرده و به آن حمله می کنند

- **پس زدن حاد:** این نوع پس زدن معمولا شیوع بالایی دارد و احتمال بروز آن در هر زمانی وجود دارد حدود ۱۵-۲۵ درصد از افرادی که تحت پیوند کلیه قرار میگیرند حداقل به مدت سه ماه پس از پیوند کلیه دچار یه دوره پس زدن حاد کلیه بصورت خفیف تا متوسط خواهند شد این نوع پس زدن کلیه قابل درمان است علایم این پس زدن بصورت کاهش حجم ادرار و افزایش کراتینین خون می باشد .

پس زدن مزمن کلیه: این وضعیت در صورتی پیش می آید که فرآیند پس زدن کلیه به طور کامل درمان نشود یا آنکه پس زدن کلیه به تدریج وبا گذر زمان پیش بیاید. به علت تغییرات دایمی ایجاد شده در بافت کلیه درمان این وضعیت بسیار دشوار است و در نهایت عملکرد کلیه به طور کامل از دست خواهد رفت . با مشاهده هر یک از علایم زیر به پزشک معالج مراجعه کنید:

- کاهش ادرار ۲۴ ساعته و یا قطع جریان ادرار

- ورم اندام تحتانی

- تب دار شدن


- احساس ضعف و بی حالی

- افزایش فشار خون

- افزایش سطح کراتینین خون

- درد و سفتی و قرمزی در ناحیه پیوند

- تیره شدن رنگ ادرار یا خون در ادرار



پس زدن کلیه پیوندی

گروه هدف: بیماران پیوند کلیه

تهیه و تنظیم: فرناز اسمعیل پور-کارشناس پرستاری

زیر نظر: اساتید بخش پیوند اعضا

تاریخ تهیه: تابستان ۹۸

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۱



پرستاران بخش پیوند ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی
به سوالات شما عزیزان می باشند.

شماره تماس مستقیم بخش پیوند: ۳۳۳۴۴۳۳۹

وب سایت: www.imamreza.tbzmed.ac.ir

منبع: کتابچه راهنمای بیماران پیوندی نوشته دکتر شیوا سموات

علی رغم مصرف دارو های مختلف که برای مهار سیستم ایمنی و جلوگیری از رد کلیه پیوندی استفاده میشود باز هم پس زدن کلیه پیوندی توسط بدن مشاهده میگردد که با آزمونهای خونی تشخیص داده میشود وبا تجویز داروهای کوتاه مدت اختصاصی درمان میشود پس زدن کلیه در بسیاری از موارد با موفقیت قابل درمان است.

اگر کلیه پیوندی پس زده شود چه باید کرد؟

اگر پیوند کلیه پس زده شود بیمار باید دیالیز شود و اگر علائمی مانند تب و درد مشاهده باید کلیه پیوندی در آورده شود اگر چند روز پس از جراحی، پیوند پس بزند باید کلیه را خارج کرد، ولی اگر چند ماه دوام بیاورد، به ندرت فرد با مشکلی روبرو خواهد شد. در این صورت فرد می تواند برای دریافت کلیه جدید اقدام کند.