

## ❖ مصرف در بارداری استامینوفن

پزشک مشخص می کند که استامینوفن برای استفاده در دوران بارداری شما بی خطر است یا خیر. اگر باردار هستید این دارو را بدون مشورت پزشک مصرف نکنید.

استامینوفن می تواند وارد شیر مادر شود. اگر شیردهی می کنید به پزشک بگویید.

این دارو را بدون مشورت پزشک به کودکان زیر ۲ سال ندهید

## ❖ عوارض جانبی

- خستگی زیاد
- تیره شدن یا کاهش حجم ادرار
- شکم درد شدید
- زردی صورت و چشم‌ها

### عوارض نادر:

- سرفه همراه با گلودرد
- خشکی و التهاب چشم
- بروز لکه‌های قرمز پوستی

## ❖ اطلاعات مهم استامینوفن

❑ در صورت بروز شرایط زیر با اورژانس تماس گرفته و یا به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید:

❑ ایجاد بثورات پوستی که ممکن است خارش، قرمز رنگ، متورم، شبیه تاول یا باعث لایه لایه ای شدن پوست شود.

❑ خس خس کردن سینه

❑ ایجاد تنگی در قفسه سینه یا گلو

❑ ایجاد مشکل در تنفس یا صحبت کردن

❑ ایجاد تورم در دهان، صورت، لب‌ها، زبان یا گلو

در صورت بروز موارد فوق ممکن است یک واکنش آلرژیک جدی تجربه کرده و نیاز به درمان فوری در بیمارستان داشته باشد.

❑ اگر تهوع، معده درد، خارش، از دست دادن اشتها، ادرار تیره، مدفوع رسی رنگ و زردی پوست و چشم‌ها دارید با پزشک خود تماس بگیرید.

❑ هنگام مصرف استامینوفن از نوشیدن الکل پرهیز کنید چرا که ممکن است باعث افزایش ریسک خطر کبدی شود

❑ در موارد مصرف طولانی مدت داروی استامینوفن، انجام تست‌های دوره‌ای بررسی عملکرد کبد، کلیه و هماتولوژیک ضروری است.

استامینوفن داروی تسکین دهنده درد و کاهش دهنده تب است که برای درمان درد خفیف تا متوسط و برای درمان درد شدید همراه با داروهای مخدر استفاده می شود .

شرایط رایجی که استامینوفن درمان می کند شامل سردرد، درد عضلانی، آرتروز، کمر درد، دندان درد، سرماخوردگی و تب است.



## ❖ موارد مصرف آپوتل

**درد:** مدیریت درد خفیف تا متوسط در بیماران  $\leq 2$  سال؛ مدیریت درد متوسط تا شدید هنگام ترکیب با بی‌دردی مخدر در بیماران  $\leq 2$  سال

**تب:** کاهش موقتی تب

## ❖ هشدارهای مصرف آپوتل

۱- در بیماران دیابتی، احتمال مثبت شدن کاذب تست قندخون وجود دارد

۲- در صورت وجود بیماری کبد و هپاتیت ویروسی با احتیاط فراوان مصرف شود .



## داروی آپوتل (استامینوفن تزریقی)



**گروه هدف:** بیماران جراحی فک و صورت

**تهیه و تنظیم:** ز. نیساری

کارشناس پرستاری

**زیر نظر:** دکتر فرهادی رییس بخش

**زیر نظر:** م. رضانی

سرپرستار بخش جراحی فک و صورت

**تاریخ تهیه:** پاییز ۱۴۰۰

**تاریخ بازنگری:** بهار ۱۴۰۴

۱

## تداخل های دارویی

از جمله داروهایی که با استامینوفن تداخل دارند، عبارتند از:

آنتی اسیدها

فنوباریتال

ایزونیازید

کلستیرامین

کتوکونازول

## منبع:

۱) www.drugs.com

۲) GYRUSCLINIC.COM

۳) Medscape

## شماره تماس واحد مربوطه

۰۴۱۳۳۳۴۷۰۵۴-۵۹ داخلی ۲۰۴۶-۲۰۴۵

آدرس و بارکد سایت مرکز

[www.imamreza.tbzmed.ac.ir](http://www.imamreza.tbzmed.ac.ir)



۶

## موارد منع مصرف

- به تاریخ انقضای دارو توجه کنید و اگر دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام شده است، از مصرف آن خودداری کنید.

- چنانچه شرایط زیر را دارید، قبل از تجویز یا مصرف بدون نسخه استامینوفن، پزشک یا داروساز را در جریان قرار دهید:

\* حساسیت به این دارو، دیگر داروها

\* شیردهی

\* مشکلات کبدی یا کلیوی

\* فاویسم (بیماری باقلایی یا کمبود G6PD)

\* آنمی یا کم خونی

\* عفونت ویروسی

\* سوء تغذیه

\* فنیل کتونوری

\* استفاده از الکل یا فرآورده‌های الکلی

\* مصرف وارفارین به عنوان رقیق کننده خون و نیاز به مصرف منظم پاراستامول

۵