


در صورت نیاز به تخلیه آبسه، غالباً تحت آرامبخشی و در شرایط استریل اتاق عمل از طریق برش پوستی یا داخل دهانی انجام میگیرد.



علاوه بر تخلیه آبسه ضروری است برای بیمار آنتی بیوتیک تجویز شود.

همچنین در بیماران مبتلا به بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی لازم است جهت تقویت سیستم ایمنی نیز اقدام شود.

تشخیص بیماری :

در صورت مشاهده علایم و تشخیص علت دندانی آبسه رادیوگرافی های مناسب درخواست شده بیمار جهت درمان ارجاع میگردد.



درمان بیماری :

درمان قطعی آبسه فکی، درمان دندانپزشکی جهت حذف عامل عفونت است که به صورت کشیدن دندان یا درمان ریشه می باشد ولی در موارد پیشرفته این بیماری، که بیمار تب دار و بدحال بوده و گلودرد و تنگی نفس نیز دارد و نمیتواند دهان خود را به صورت کامل باز کند و نیز در بیمارانی که شرایط پزشکی پیچیده ای دارند، ضروری است بیمار در بیمارستان بستری شده و تحت نظر قرارگیرد و در صورت لزوم جهت تخلیه آبسه و کشیدن دندان عامل عفونت در اتاق عمل اقدام شود.

تعریف بیماری آبسه :

آبسه فکی، عفونت دندانی درمان نشده ای است که گسترش یافته و به صورت تورم لثه، صورت و گردن بروز میکند.

علل و منشاء بیماری :

آبسه فکی میتواند به دلیل دندان پوسیده و درمان نشده، وجود دندان نیمه نهفته و عفونی شدن آن، التهاب لثه و گاهی به دنبال انجام درمان دندانپزشکی رخ دهد.

علائم و نشانه های بیماری :

درد، تورم داخل دهانی یا تورم صورت و گردن، تب، ناتوانی در باز کردن کامل دهان، احساس وجود چرک در دهان، گلودرد و در موارد شدیدتر احساس تنگی نفس از علایم آبسه فکی می باشد.

آبسه فکی در کودکان و بیمارانی که شرایط پزشکی پیچیده ای دارند به سرعت پیشرفت کرده و در صورت عدم درمان میتواند منجر به عوارض غیرقابل جبران از جمله گسترش عفونت و درگیری ارگان های حیاتی گردد.



بیماری آبسه



گروه هدف: بیماران فک و صورت

تهیه و تنظیم: ز. نیساری

کارشناس پرستاری

زیر نظر: دکتر فرهادی رییس بخش

زیر نظر: م. رضانی

سرپرستار بخش جراحی فک و صورت

تاریخ تهیه: تابستان ۹۹

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۴

- آبسه فکی به سادگی با رعایت بهداشت دهان و دندان، ویزیت های منظم دندانپزشکی و درمان دندان های پوسیده قابل پیشگیری است.

- لازم به ذکر است که تورم صورت بلافاصله بعد از تخلیه آبسه به صورت کامل فروکش نخواهد کرد، فرایند بهبودی زمانبر بوده و مشروط به حذف عامل عفونت از طریق کشیدن دندان عفونی یا درمان ریشه آن دندان میباشد.

منبع:

-پرستاری داخلی جراحی برونر سوارث

-جراحی فونسکا

شماره تماس واحد مربوطه

۰۵۴-۴۱۳۳۳۴۷-۵۹ داخلی ۲۰۴۶-۲۰۴۵

آدرس و بارکد سایت مرکز

www.imamreza.tbzmed.ac.ir



آموزش خودمراقبتی:

* مراقبت های پس از ترخیص

- مصرف دارو های تجویز شده طبق دستور پزشک
- رعایت بهداشت دهان با مسواک و خمیر دندان و دهانشویه
- رژیم غذایی نرم و مایعات و پرهیز از مواد لبنی به مدت ۱۰ روز بعد عمل
- پانسمان زخم طبق دستور پزشک معالج
- مراجعه به دندانپزشک جهت تکمیل درمان دندانپزشکی طبق نظر پزشک معالج
- مراجعه مجدد به پزشک معالج در زمان های تعیین شده
- انجام فیزیوتراپی جهت افزایش میزان باز کردن دهان طبق دستور پزشک معالج



- آموزش سلامت: از مصرف دخانیات ، مشروبات الکلی اجتناب نمایید.از استرس و اضطراب دوری نمایید، از داشتن اضافه وزن پرهیز نمایید.