

نکات مهم در خصوص کلیندامایسین

□ **اسهال خفیف** از عوارض معمولی این دارو است به ندرت ممکن است **اسهال شدید** با مصرف کلیندامایسین ایجاد شود. ولی چنانچه **اسهال شدید آبکی** و یا **اسهال خونی** مشاهده شود لازم است فوراً مصرف کلیندامایسین را قطع و به پزشک اطلاع دهید.

□ خودسرانه دارو را قطع نکنید و دوره درمان این دارو را کامل کنید و کپسول کلیندامایسین را در زمان های مشخصی که پزشک تجویز کرده مصرف کنید حتی اگر علائم بیماری کاهش یافته و یا از بین رفته باشد. از مصرف خود سرانه این دارو خود داری کنید. مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها ممکن است باعث مقاومت میکروبی شود.

□ کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان آب بلعیده شود تا موجب تحریک مری نشود

□ کلیندامایسین با طیف گسترده ای از داروها تداخل دارد بنابراین لازم است حتماً قبل از مصرف این دارو داروهای مصرفی خود را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید.

□ در زمان تجویز کلیندامایسین ، در صورتی که هر یک از شرایط زیر را دارید به پزشک گزارش دهید:

- ابتلا به کولیت، کرون و هرگونه اختلال در روده
- اگر آگزما یا هرگونه حساسیت پوستی دارید
- اگر بیماری کبدی دارید
- در صورتی که آسم و تنگی نفس دارید
- اگر به داروی آسپرین حساسیت دارید
- اگر باردار هستید
- در صورتی که در دوران شیردهی هستید
- در صورت مصرف اریترومایسین



تداخلات دارویی کلیندامایسین

کلیندامایسین اثر داروهای شل کننده عضلانی غیر دپولاریزان را افزایش می دهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین و پیریدوستیگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کلرامفنیکل توصیه نمی شود.

کلیندامایسین چیست؟

کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که مانع از تکثیر باکتری ها می شود به همین دلیل جزء آنتی بیوتیک های باکتریوستاتیک طبقه بندی می شود.

کلیندامایسین فقط بر عفونت های ناشی از باکتری ها موثر است و بر عفونت های ویروسی مانند آنفلوانزا و سرماخوردگی بی تاثیر است. کلیندامایسین برای عفونت های شدید و خطرناک میکروب های بی هوازی، آمینویوتیک، زخم های ناشی از گزش (حیوانات یا انسان)، پیشگیری از عفونت های پس از جراحی، عفونت های واژینال، تنفسی، استرپتوکوک های گروه B ، پیشگیری از عفونت های اندوکاردیت و ... کاربرد دارد.





داروی کلیندامایسین



گروه هدف: بیماران جراحی فک و صورت

تهیه و تنظیم: ز. نیساری

کارشناس پرستاری

زیر نظر: دکتر فرهادی رییس بخش

زیر نظر: م. رضانی

سرپرستار بخش جراحی فک و صورت

تاریخ تهیه: پاییز ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۴

هشدار های کلیندامایسین

۱- در صورت بروز اسهال یا علائم کولیت باید مصرف این دارو را بلافاصله قطع کرد. همچنین در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود .

۲- پیگیری کار کبد و کلیه در طول درمان دراز مدت با این دارو و نیز در طول درمان کودکان ضروری است.

منبع:

۱) www.drugs.com

۲) www.webmd.com

۳) Medscape

۴) درمان استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت بر مبنای نئوستیگمین و پیریدوستگمین و آنتاگونیستی (مقاله تائید شده دکتر عادل بهنام پور در مجمع سالیانه کارشناسان عالی بهداشت جهانی WHO-LK

شماره تماس واحد مربوطه

۰۵۴۷۰۳۳۳۴۷۰۴۱۳۳-۵۹ داخلی ۲۰۴۶-۲۰۴۵

آدرس و بارکد سایت مرکز

www.imamreza.tbzmed.ac.ir



موارد مصرف کلیندامایسین

کلیندامایسین در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود.

منع مصرف کلیندامایسین

در صورت ابتلای بیمار به اسهال از این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی کلیندامایسین

اسهال (که در صورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد) ، احساس ناراحتی در شکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، بثورات جلدی، یرقان و تغییر در پاسخ آزمون های کبدی، کاهش نوتروفیل های خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکت های خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شده اند.

مصرف کلیندامایسین در شیردهی

کلیندامایسین از طرق شیر مادر به بدن نوزاد منتقل می شود و میتواند برای نوزاد مضر باشد . در صورتی که در دوران شیردهی هستید قبل از مصرف کلیندامایسین با پزشک مشورت کنید.