

موارد احتیاط و هشدارها

* دارو باید تنها در حالی که آشکارا استفاده از آن مورد داشته باشد در دوران بارداری مصرف شود. مصرف آمپی سیلین در دوران بارداری با متابولیسم و چرخه روده ای کبدی استروئیدها تداخل عمل داشته و غلظت ادراری متابولیت های استروژن را کاهش می دهد.

* مصرف آن در طی دوران شیردهی باید با احتیاط صورت پذیرد .

* در صورت حساسیت بیمار به سفالوسپورین ها نیز تجویز با احتیاط صورت گیرد و در صورت ایجاد علائم حساسیت دارو بایستی سریعاً قطع شود.

* در بیماران آسمی با احتیاط مصرف شود.

* در بیماران با نقص کلیوی بسیار احتیاط شود. خطر بروز شوک آنافیلاکسی وجود دارد.

* بروز راش پوستی باید با دقت بررسی شود مبادا علائمی از بروز واکنش های حساسیتی باشد.

* مصرف طولانی مدت ممکن است باعث رشد قارچ شود.

نکات مهم

☞ احتمال ایجاد واکنش های آنافیلاکتیک شدید و منجر به مرگ با مصرف این دارو وجود دارد که در افرادی که سابقه حساسیت به پنی سیلین را دارند محتمل تر است.

☞ بعثت احتمال ایجاد هیپاتوتوکسیستی منجر به مرگ ، بیمار بایستی طی درمان از لحاظ سلامت کبد بررسی شود.

☞ احتمال ایجاد کولیت سودوممبران نیز وجود دارد و علائم آن نیز بایستی به بیمار توضیح داده شود .(ایجاد اسهال آبکی و خونی و کرامپ های شکمی شدید)

☞ از آنجا که احتمال ایجاد راش جلدی در طی درمان منونوکلئوز عفونی با این دارو وجود دارد بنابراین استفاده از این دارو در درمان منونوکلئوز عفونی بایستی محدود شود.



ترکیبی است از آنتی بیوتیک پنی سیلینی پر کاربرد یعنی آمپی سیلین و سولباکتام که یک مهار کننده بتا-لاکتاماز باکتریایی است.

آمپی سیلین/سولباکتام برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های بتا-لاکتامی استفاده می شود.

سولباکتام با مسدود کردن آنزیمی که موجب تجزیه آمپی سیلین می شود به آمپی سیلین اجازه می دهد تا باکتری ها را مورد حمله قرار داده و از بین ببرد.



موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، سوزاک، عفونت های پوستی، آندوکاردیت، عفونت های زنانه، عفونت های داخل شکمی، پروفیلاکسی جراحی مصرف می شود.



داروی آمپی سیلین / سولباکتام



گروه هدف: بیماران جراحی فک و صورت

تهیه و تنظیم: ز. نیساری

کارشناس پرستاری

زیر نظر: دکتر فرهادی رییس بخش

زیر نظر: م. رضانی

سرپرستار بخش جراحی فک و صورت

تاریخ تهیه: پاییز ۱۴۰۰

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۴

تداخلات دارویی

* مصرف همزمان آمپی سیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود.

* مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوتروکسات منجر به کاهش کلیرانس متوتروکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

* سفپیم ، آلپورینول، آمینوگلیکوزیدها، ضد انعقادها

منبع:

۱) www.medlineplus.gov

۲) www.daroooyab.ir

۳) Medscape

شماره تماس واحد مربوطه

۰۵۴۷۰۳۳۳۳۴۷-۰۴۱۳۳۳۳۳۳۳۳-۵۹ داخلی ۲۰۴۶-۲۰۴۵

آدرس و بارکد سایت مرکز

www.imamreza.tbzmed.ac.ir



عوارض جانبی

* واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

* همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال، بثورات جلدی می باشند.

* استفراغ، تب، آسم، دردهای شکمی

* کاندیدیازیس، لکوپنی، ترومبوسایتوپنی

* التهاب و درد محل تزریق، ترومبوفلیت، فلیت

* افزایش آنزیم های کبدی

* واژینیت، عفونت مجدد، راش

موارد منع مصرف

* در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود

* ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن

* سابقه کلستاز کبدی ناشی از این دارو

* سابقه هیپاتیت ناشی از این دارو