

تعریف بیماری

تومور مغزی عبارت است از رشد یک توده غیر طبیعی در مغز که امکان دارد خوش خیم یا بد خیم (سرطان مغز) باشد. توجه داشته باشید که امکان ندارد یک تومور خوش خیم مغز به اندازه یک تومور بدخیم ناتوانی ایجاد کند، مگر اینکه بطور نامناسب تحت درمان قرار گیرد.



علل تومور های مغزی :

بعضی از تومورها از بافت مغز منشا می گیرند که تومور های اولیه هستند. اما اغلب تومورهای مغز در اثر گسترش سرطانهای سایر نقاط بدن بخصوص سرطان پستان، ریه، روده یا ملانوم (سرطان بدخیم پوست) به مغز ایجاد می شود. علائم در اثر افزایش فشار داخل جمجمه ناشی از بزرگ شدن تومور و تخریب بافتهای سالم توسط تومور و فشار تومور به سایر قسمت های مغز اعصاب و عروق مغزی بوجود می آیند.

علائم و نشانه های بیماری

سردردی که با دراز کشیدن بدتر می شود

تهوع و استفراغ

ضعف حرکتی دست و پای یک طرف بدن

تاری دید یا دوبینی

عدم تعادل و گیجی

از دست دادن حس بویایی

تشنج

تغییرات خلق و خو

از دست دادن هوشیاری

انواع اختلالات روانی

تومورهای مغزی چگونه تشخیص داده می شوند:

سی تی اسکن ، ام آر آی و عکس برداری از جمجمه

•درمان بیماری

• تومور های مغزی چگونه درمان می شوند:

عمل جراحی - شیمی درمانی - پرتو درمانی

داروهای کورتیزونی برای کاهش فشار مغز، داروهای ضد

تشنج برای کنترل حملات تشنج ، و داروهای ضد درد و

داروهای ضد سرطان برای درمان استفاده می شوند.

چه عواملی خطر بروز تومورهای مغزی را افزایش می

دهد:


عوامل خطر ذکر شده در زیر مربوط به سرطانهای سایر نقاط

بدن هستند که می توانند به مغز پیشروی کنند:

- تغذیه نامناسب بخصوص کم بودن فیبر غذایی که در ایجاد سرطان روده
- سیگار کشیدن عامل خطر سرطان ریه
- افراط در مصرف الکل عامل خطر سرطان کبد
- قرار گرفتن بیش از حد در مقابل آفتاب عامل خطر سرطان پوست
- وجود سرطان های سایر نقاط بدن



بیماری تومور مغزی



گروه هدف: بیماران دارای تومور مغز

تهیه و تنظیم: حکیمه اسمعیل زاده (کارشناس پرستاری)

زیر نظر: استاد محترم دکتر فرهاد میرزایی رئیس بخش)

تاریخ تهیه: مرداد ۱۴۰۲

تاریخ بازنگری: خرداد ۱۴۰۴

موضوع تومورهای مختلف مغزی



منابع: برونر و سودارث

شماره تماس واحد مربوطه

آدرس بیمارستان امام رضا (ع)

تبریز - خیابان دانشگاه - مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی

امام رضا (ع)

تلفن: ۳۳۳۴۷۰۵۴-۹ دورنویس: ۳۳۳۳۵۵۹۹

وب سایت: www.imamreza.tbzmed.ac.ir



آموزش خودمراقبتی

۱- بررسی هرگونه تغییر در سطح هوشیاری

۲- مراقبت از زخم محل عمل

۳- رعایت بهداشت فردی

۴- کنترل تشنج و کنترل درد

۵- میزان فعالیت بیمار که در اولین فرصت باید به روال قبل برگردد و حدود یک ماه و نیم از رانندگی خودداری کند و محدودیت استفاده از گوشی همراه.

۶- پیروی از رژیم تجویز شده توسط پزشک و مصرف سبزی و میوه تازه، ویتامین C و مواد پروتئینی.

۷- آموزش نحوه صحیح استفاده از داروها (میزان-زمان - روش)

۸- زمان مراجعه به پزشک بعد از ترخیص

۹- بیان علائم هشدار از قبیل وجود هرگونه ترشح شفاف از بینی و گوش - تشنج - تهوع و استفراغ - تنگی نفس - سردرد - حساسیت به داروها - ناتوانی در اندامها و ناتوانی در دفع ادرار و مدفوع