


راهنمای خود مراقبتی

سرطان مری



گروه هدف: بیماران مبتلا به سرطان مری

تهیه و تنظیم:

سرپرستار I.C.U جنرال

ف. اربابی


زیر نظر:

دکتر کامران شادور

تاریخ تهیه: تابستان ۱۳۹۹

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۱

آیا سرطان مری قابل پیشگیری است؟ برخی عوامل خطری که در ارتباط با سرطان مری هستند، مثل کشیدن سیگار قابل تغییرند، اما برخی مثل سن غیر قابل تغییر می باشند. شما می توانید برخی کارهای زیر را برای کاهش خطرات ابتال به سرطان مری انجام دهید: نکشیدن سیگار و اجتناب از مصرف زیاد الکل • درمان مناسب و سریع بیماریهایی که میتوانند در ایجاد سرطان مری نقش داشته باشند. • برخی تغییرات دیگر در شیوه زندگی مثل کاهش مصرف چربی، اجتناب از خوردن مایعات داغ، عدم مصرف نیتروزامین (یک افزودنی غذایی)، مصرف مناسب میوه ها و سبزیجات.



با ارزیابی بهبودی و سلامتی روز افزون

منبع: برونر - سودارت

www.Imamreza.tbzmed.ac.ir

شماره تماس واحد مربوطه: ۰۴۱۳۳۳۴۷۰۵۴

۲. در بیماران جراحی شده به دلیل حذف مری اکثر بیماران در ابتدا، ۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت پس از صرف غذا احساس ناخوشایندی را تجربه می کنند که به صورت نفخ، گرفتگی و درد شکم و اسهال به همراه ضعف و تعریق و تپش قلب می باشد (سندروم دامپینگ گفته می شود) که معمولاً به تدریج و با رعایت نکات زیر برطرف می شود: در طی روز ۶-۷ وعده غذا در حجم کم مصرف کنید. صبحانه، میان وعده، ناهار، میان وعده، عصرانه، شام • غذا را آهسته خورده و به خوبی بجوید. • از مواد غذایی با پروتئین بالا (تخم مرغ، گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، پنیر)، چربی متوسط استفاده کنید. • غذاهای پر فیبر بخورید: نان گندم، ماکارونی سبوس دار، میوه و سبزی تازه، انواع لوبیا، غالت سبوس دار • اگر در زمان مصرف غذاهای خیلی شیرین (انواع شیرینی ها، آبنبات، شکالت، آبمیوه، ژله، شربت) دچار تهوع، استفراغ و یا اسهال می شوید، از خوردن این مواد خودداری کرده و یا خوردن آنها را محدود کنید. قند موجود در شیر نیز می تواند باعث علیم شود. از آن نیز اجتناب نمائید معمولاً ماست بهتر تحمل می شود. در زمان غذا خوردن، آب و یا مایعات نخورید و خوردن آنرا تا یک ساعت بعد از غذا عقب بیندازید. • در حین غذا خوردن صاف بنشینید و بعد از هر وعده غذایی حداقل ۲ ساعت در وضعیت نشسته قرار گیرید. برای بهبود وضعیت تنفسی، در اتاق بیمار از مرطوب کننده هوا (بخور) استفاده نمایید

۸. سرفه های مزمن و خونی . ۹. سطح کلسیم بالای خون ۱۰ . کاهش وزن بدن و قدرت بدنی **سرطان مری چگونه تشخیص داده می شود** : در صورت پیدایش دشواری در بلع و یا عالمم دیگر ، تست های مختلفی قابل انجام است .مانند . ۱ : رادیو گرافی با باریوم: با خوردن باریوم و مطالعه مهری بها اشعه می توان رشد مری را در یک منطقه بررسی کرد . ۲ آندوسکوپی: مشاهده مستقیم مری از طریق دسپتنگ اه آندوسکوپ توسط پزشک متخصص می باشد . مزیت ایهن روش این است که امکان نمونه برداری (بیوپسی) از مهری در این روش وجود دارد . ۳. تی اسکن **سرطان مری چگونه درمان می شود؟** انتخاب نحوه درمان بستگی دارد به اندازه سرطان ، محل ل آن در مری و میزان انتشار آن به قسمت های مجاور ۵ . روش اسپهتانداری کهه معمموال بهرای درمهمان اسپهتفده میشوند عبارتند از :

- جراحی باز کردن مسیر مری) بوسيله سهواری، بهالن دیالتوره
- ۱ و گذاشتن استنت* (رادیوتراپی *شیمی درمانی *روش های لیزر درمانی آموزش خودمراقبتی :اگر از روش جراحی برای درمان بیماری شما استفاده شده است ۷-۵ . ۱ : روز پس از عمل جراحی ، سوند بینی خارج مهی شود . بعد از انجام رادیو گرافی بلع باریوم و نیهود نشه ت از محل عمل جراحی تغذیه با جرعه های کوچک آب و سپس مواد غذایی پوره شده کم استفاده

طولانی مدت با اسید معده شبیه سلول های پوشاننده معده می شوند که این حالت با خطر بالایی از سرطان مری همراه است . ۱۰. آشالزی :حالتی است که در ان انتهای لوله مری بسته می شود و جلوی عبور غذا و مایعات به معده را می گیرد .مری در بالی محل گرفتگی نازک و متسع (گشاد) می شود . ادامه این حالت در طوانی مدت شانس ابتال به سرطان مری را بال می برد. ۱۰ . تماس شغلی با مواد شیمیایی : تماس طوانی مدت برخی مواد همچون پرکلرواتیلن (ماده ای است که در صنایع خشکشویی به کار می رود. ۱۱) سن بال : شانس سرطان مری در گروه سنی ۷۰ تا ۸۰ سال بیشتر است. ۱۲ . جنس :مردان ۳ برابر خطر بیشتری نسبت زنان دارند. ۱۳ . استعمال دخانیات و مصرف الکل **سرطان مری چه نشانه هاوعلائمی دارد ؟** ۱۰. در اکثر موارد اولین علامت اشکال و سختی در بلع مواد غذایی می باشد. بیمار احساس می کند غذا در گلویش گیر می کند . در ابتدا این مشکل در حین بلع مواد غذایی جامد (سیب ، گوشت و...) می باشد ، بعدا ممکن است در بلع غذاهای نرم وحتی مایعات نیز دچار مشکل شود. ۲ . درد در هنگام بلع غذا . ۳ احساس درد یا پری زیر جناق سینه . ۴ آبریزش دهان به دلیل عدم بلع بزاق . ۵ پس زدن غذای هضم نشده . ۶ استفراغ (همراه تنفس بد بو و سکسکه. ۷) خونریزی گوارشی

تعریف بیماری: سرطان مری یکی از ۱۰ سرطان های شایع در جهان است . ایران یکی از مناطق با خطر بالای سرطان مری است . بیشتر موارد ابتال سرطان مری در شمال کشور ایران می باشد. در یک پژوهش که توسط موسسه سرطان ایران انجام شد ۹ درصد همه سرطان ها و ۲۷ درصد سرطان های گوارشی مربوط به کشور ما، سرطان مری می باشد (.مری لوله ای توخالی است که غذا و مایعات را از حلق به معده منتقل می کند . در هنگام بلع ، دیواره عضلانی مری منقبض شده و غذا به درون معده رانده می شود .وقتی که سلولهای غیر طبیعی در مری خارج از کنترل طبیعی شروع به رشد و افزایش تعداد کنند ، توده ای از سلولهای غیر طبیعی در مری به وجود می آید که به آن "تومور یا سرطان مری " گفته و مری دیگر نمی تواند مانند قبل ،عملکرد طبیعی خود را انجام دهد . **سرطان مری چگونه ایجاد می شود؟(علل ومنشا)** علت دقیق ایجاد سرطان مری مشخص نیست . به نظر می رسد که عوامل زیرابتال به این بیماری را افزایش می دهد ۱ : مصرف سیگار . ۲ مصرف الکل . ۳ رژیم غذایی پر چرب و با پروتئین و کربوهیدرات کم و نیز مصرف زیاد مواد غذایی حاوی نیترات ۴ . خوردن طولانی مدت مایعات و یا غذاهای داغ . ۵ فقر مواد غذایی(مانند کمبود شدید آهن. ۶)بهداشت بد دهان ۷ . تحریک طوانی مدت مری بوسيله اسید . ۸ بیماری رفالکس معده به مری که در آن اسید معده از سمت معده به مری بر می گردد ، افراد دچار رفالکس طوانی مدت در معرض خطر بالای سرطان مری هستند . ۹ مری بارت) مری کوتاه(: افرادی که دچار رفالکس طوانی مدت هستند احتمال دچار مری بارت می شوند که در این بیماری سلولهایی که مری را می پوشاند در اثر تماس